

Figyelemfelhívás magyar polytrauma regiszter indítására *Egy tömegbaleset bemutatása*

DR. CSONKA ENDRE¹, DR. TUBOLY ESZTER², DR. JÁVOR PÉTER¹, DR. VARGA ENDRE¹

Érkezett: 2020. október 16.

DOI: 10.21755/MTO.2020.063.0104.007

ÖSSZEFOGLALÁS

Az utóbbi évtizedekben a sürgősségi traumatológia területén elért fejlődés és paradigmaváltások országos és nemzetközi regiszterek, valamint nagy elemszámú kohortok elemzésein alapultak. Cikkünk összesen 20 személy sérülésével járó tömegbaleset bemutatásán és az érintettek kezelése során nyert adatok elemzésén keresztül hívja fel a figyelmet a hazai trauma regiszter indításának szükségességére. A bemutatni kívánt tömegbaleset sérültjei közül kiválogattuk a súlyos sérülést szenvedett (Injury Severity Score ≥ 16), helyszínen nem reszuscitált, 16. életévet már betöltött személyeket. Ezen betegeknek a sérüléstől számított 6. és 72. órában levett rutin laborparaméterei kigyűjtésre kerültek. A paraméterek változásai, illetve egymással való kapcsolatuk Spearman–rangkorrelációk segítségével, SigmaStat 12.0 programban került elemzésre. 2017. október 3-án 8 súlyos sérült (átlagéletkor: 34,85 \pm 2,97; medián Injury Severity Score: 31.5 [27.5–37]) érkezett egy időben a sürgősségi osztályunkra. Szignifikáns negatív kapcsolat igazolódott a 6 órás fehérvérsejtszám és a 72 órás kreatinin szint között ($r_s = -0,949$; $p = 0,0167$), valamint a 6 órás trombocitaszám és a 72 órás kreatinin szint között ($r_s = 0,876$; $p = 0,0833$). Hat és 72 órával a sérülés után mért rutin laborparamétereknek a két mintavétel között eltelt időintervallumban való változását vizsgálva a kreatinin, fehérvérsejt- és trombocitaszám mutattak szignifikáns változást. Súlyos sérülés után 6 és 72 órával mért kreatinin, fehérvérsejt- és trombocitaszámok kombinációban vizsgálva prediktív értékkel bírhatnak a kezelés kimenetelére. Új prognosztikus faktorok feltárásában egy esetleírás erősen korlátozott értékkel bír, véleményünk szerint eredményeink igazolásához és a hazai traumatológiai kutatás további fejlődéséhez egy magyar trauma regiszter elindítása lenne szükséges.

Kulcsszavak: *Polytrauma; Regiszterek; Sérülések; Szisztémás gyulladásoz immunválasz szindróma; Többszervi elégtelenség; Tömegbaleset;*

E. Csonka, E. Tuboly, P. Jávor, E. Varga: Need for a National Trauma Registry – Presentation of a mass casualty

In the past decades, the development and paradigm shifts of trauma care were based on national and international registry and large cohort analyzes. The present study underlines the need for a Hungarian trauma registry through the presentation and analysis of a mass casualty with 20 injured people. Severely injured (Injury Severity Score ≥ 16), adult (≥ 16 years of age) patients who did not receive cardiopulmonal resuscitation on scene, were selected. 6 and 72 hour post-injury routine labor parameters were collected retrospectively. The changes and associations of the parameter were analyzed with Spearman rank correlation tests in SigmaStat 12 software. On the 3rd October 2017, 8 severely injured patients (mean age: 34,85 \pm 2,97, median Injury Severity Score: 31.5 [27.5–37]) arrived to our Emergency Department at the same time. Our statistical analysis revealed a significant negative relationship between white blood cell count at 6 hours and blood creatinine level at 72 hours ($r_s = -0.949$; $p = 0.0167$) and between platelet count at 6 hours and creatinine at 72 hours ($r_s = 0,876$; $p = 0,0833$). The combination of these associations might have a predictive value for the outcome. Creatinine, white blood cell and platelet counts showed significant changes when their values at 6 and 72 hours were compared. The associations of creatinine levels, white blood cell and platelet counts measured at 6 and 72 hours post-injury might have a predictive

EREDMÉNYEK


Esetbemutató

2017. október 3-án egy hétszemélyes mikrobusz a hatóságok elől nagy sebességgel menekülve letért az útról, felborult, majd többször átfordult. Az átalakított, utasülések nélküli hétszemélyes járműben a sofőrön kívül 19 személy utazott, köztük 3 gyerek. Az éjszakai órákra való tekintettel légi mentés nem volt elérhető. A földi mentőegységek két utast a jármű alá szorulva találtak. Egy utas a helyszínen az életét veszítette, két személyen kritikus állapotok miatt helyszíni újraélesztést kellett kezdeni, 9 súlyos, 8 utas pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A 9 súlyos sérültből 2 még nem töltötte be a 16. életévét, 1 személyt pedig elsőként nem az SZTE Traumatológiai Klinikára szállítottak a mentőegységek. Mindezek következtében 6 páciens került bevonásra analízisünkbe (1. ábra).

A helyszínen minden sérültnél perifériás vénabiztosítás, intravénás fájdalomcsillapítás, valamint kristalloid infúzió bekötése történt, a nyaki gerinc és a sérült végtagok rögzítése

mellett. Egy beteget intubálva, lélegeztetve szállítottak, a többi sérült arcomszkon keresztül 100% O₂ szupplementációval került szállításra. Az átlagos szállítási idő az elhúzódó műszaki mentés miatt 111±28,61 perc volt.

Az SZTE Traumatológiai Klinika beteget ATLS protokoll szerint kerültek ellátásra, klinikánk bázisa a magyarországi ATLS tanfolyamoknak, a legtöbb kollégánk és a társszakmák képviselői is nagy számban végezték el kurzusainkat. A sérültek triage beosztása döntötte el, melyik team látja el sérüléseit. Minden team egy traumatológusból (C, E doktor), egy aneszteziológusból (A, B, D doktor), egy traumás nővérből és egy aneszteziológus asszisztensből állt. A két kiskorú sérült stabilizálást és másodlagos állapotfelmérést követően a Gyermekklinika Gyereksebészeti Osztályára került. Két felnőtt személy az ITO-ra, majd műtőbe került, egy non-responder sérültet pedig azonnal műtőbe szállítottak, ahol azonban életét veszítette. Minden beavatkozás a damage control surgery szellemében történt, a töréseket elsődlegesen fixateur externe-nel rögzítettük. Egy sérült intracranialis vérzését idegsebész látta el.



1. ábra Betegek beválogatása az analízisbe.

A bemutatni kívánt tömegbalesetben 20 személy sérült. Egy ember a helyszínen életét veszítette. Két személyen a mentőegységek a helyszínen újraélesztést kezdtek, 8-an pedig csak könnyebb sérüléseket (ISS <16) szenvedtek, így kizárásra kerültek az analízisből. A fennmaradó 9 súlyos sérült (ISS ≥16) közül 2-en még nem töltötték be 16. életévüket, 1 személyt pedig a mentők egy másik vidéki kórházba szállítottak első ellátásra. Végül 6 személy adatai kerültek elemzésre.

A sérültek demográfiaja és laborparaméterei

2017. október 3-án 8 személy, 6 felnőtt és két kisgyermek érkezett egyszerre az SZTE Sürgősségi Betegellátó Osztályára többszörös

törésekkel és tompa testüregi traumás sérülésekkel. A felnőttek átlagéletkora 34.85 ± 2.97 év, medián ISS-je 31.5 [27.5–37] volt. A tömegbaleset következményeként az intézetünkben kezelt sérültek közül egyetlen személy hunyt el (I. táblázat).

I. táblázat A sérültek demográfiai adatai és laborparaméterei

Az analízishez kiválasztott felnőtt sérültek átlagéletkora 34.85 ± 2.97 év, medián ISS-je 31.5 [27.5–37] volt. Egyetlen haláleset történt, 16.66%-os mortalitási rátát eredményezve.

Demográfia és mortalitás		
Életkor átlag \pm SD	34.85 \pm 2.97	
Férfi nem %	83.44	
ISS	36.83 \pm 14.93	
ISS medián [IQR]	31.5 [27.5–37]	
Mortalitás (%)	16.66	
Laborparaméterek	6 órával a sérülés után	72 órával a sérülés után
Bázisfelesleg/többlet (mmol/l)	-2.13 \pm 2.90	0.47 \pm 3.09
Laktát (mmol/l)	3.23 \pm 1.50	1.27 \pm 0.67
WBC (G/L)	18.69 \pm 6.22	7.56 \pm 0.91*
PLT (G/L)	251.83 \pm 80.99	126.00 \pm 19.15*
Kreatinin (μ mol/l)	88.00 \pm 13.58	63.5 \pm 5.97*
Bilirubin (μ mol/l)	10.34 \pm 1.32	24.73 \pm 17.51
AST (U/l)	79.4 \pm 20.05	70.33 \pm 26.57
ALT (U/l)	64.4 \pm 22.26	51.33 \pm 34.36
GGT (U/l)	29.6 \pm 18.42	19.67 \pm 14.22


*P>0.05

Statistikai vizsgálatok eredménye

A 6 órás WBC és a 72 órás kreatinin szint között ($r_s = -0,949$; $p = 0,0167$), valamint a 6 órás PLT és a 72 órás kreatinin szint között ($r_s = 0,876$; $p = 0,0833$) szignifikáns negatív korreláció igazolódott, ezen változásoknak lehet prediktív ereje

kombinációban vizsgálva (2. ábra).

A 6 és 72 órával a sérülés után mért rutin laborparamétereknek a két mintavétel között eltelt időintervallumban való változását vizsgálva a PLT, WBC és kreatinin szintek mutattak szignifikáns változást (2. ábra).



2. ábra Szignifikáns kapcsolatok a 6 és 72 órás laborparaméterek között.

A 6 órás WBC és a 72 órás kreatinin szint között ($r_s = -0,949$; $p = 0,0167$) (2A), valamint a 6 órás PLT és a 72 órás kreatinin szint között ($r_s = 0,876$; $p = 0,0833$) (2B) szignifikáns negatív kapcsolat igazolódott.

MEGBESZÉLÉS

Eredmények interpretálása

Jelen cikkünk olyan tömegbalesetet mutat be, amelyben összesen 20 személy volt érintett. A súlyos sérültek kezelése során nyert adatok elemzésre kerültek. Vizsgálataink a sérülés után 6 és 72 órával levett rutin laborparaméterek változásainak dinamikáját, illetve egymással való kapcsolatát célozták meg a kezelés kimenetelére nézve potenciálisan prediktív értékkel bíró, új összefüggések kimutatása céljából.

A szakirodalomban jól dokumentált tény, hogy jelentős sérülések után a szöveti károsodás erős immunmodulátor hatású markerei szabadulnak fel, olyan hiperakut gyulladáskeltő citokinekként mint a tumor nekrozis faktor- α (TNF- α) és interleukin 1B, (IL-1B). A citokin felszabadulás Toll-like receptorok (TLR) aktivációját okozza 1–2 órával később (10). Ezt a folyamatot a legjobban tetten érni közvetlenül a

baleset után lehetne, egy helyszíni vérvétellel. A korai, szubakut citokinek (IL-6, IL-8, és IL-12, IL-18), valamint kemokinek és leukocita migrációs faktorok felszabadulása polimorfonukleáris sejt túlaktiválódást és reaktív oxigén gyökök (ROS) képződését okozza, melyek súlyosan befolyásolják a sérülés, illetve a kezelés kimenetelét (9). A fenti reakciók csúcsa a sérüléstől számított 4 és 12 óra között van (1, 11), így 6 órával a trauma után történő mintavétel ezen korai fázis vizsgálatára megfelelőnek tűnik. Széles körben elfogadott, hogy a korai nagymértékű pro-inflammatorikus és a későbbi anti-inflammatorikus folyamatok képesek egymást facilitálni, destruktív immunológiai diszonzanciát fenntartva (2). Ez nagyon súlyos következményekhez, SIRS-hez, többszervi elégtelenséghez (MOF) vezethet az első 72 órában (4). Mintavételeinket azért időzítettük 6 és 72 órával a sérülés után, hogy a laborparaméterek változását a fent leírt fázisokban vizsgálhassuk.

Vizsgálatunkban a 6 órás WBC és a 72 órás kreatinin szint között, valamint a 6 órás PLT és

a 72 órás kreatinin szint között szignifikáns negatív kapcsolat igazolódott, ezen változásoknak lehet prediktív ereje kombinációban vizsgálva. Szemléltettük, hogy egyetlen baleset elemzése hipotézisek felállítására ugyan alkalmas mennyiségű, azonban egyértelmű következtetések levonásához kevés, illetve korlátozott értékű tudományos információt szolgáltat. Tudományos hipotézisek validálásához nagy mennyiségű, egységes célból és módon, strukturáltan gyűjtött adatokra van szükség, amelyre megoldást egy hazai trauma regiszter elindítása szolgálhatna. A trauma regiszterek tartalmazzák a sérültek demográfiai adatait, a sérülés körülményeit, prehospitalis ellátást és transzportot, az első intézeti ellátás beavatkozásait, a sérülések anatómiai leírását, fiziológiai paramétereket, szövődményeket és a kimenetelt. Fontos és gyűjtendő adat a megelőző betegségek szerepeltetése, amelyek a kortól és a sérülések súlyosságától függetlenül is befolyásolják a kimenetelt. A jól dokumentált regiszter tartalmazza a laborértékeket is, amelyek elővetíthetnek rizikó faktorokat és másodlagos triggeret nem kívánatos események

bekövetkeztéhez, ugyanakkor alkalmasak tudományos rizikó felmérésre, algoritmus alapú prediktív információkat adhatnak a kimenetelre. Fontos, hogy jó leírást adjon a helyi populációról, nemzeti regiszterként illeszkedve a nagyobb, összehasonlító regiszterekhez, és lehetőséget adjon a hasonlóságok és különbségek megfigyeléséhez.

Következtetés

A jelenlegi eseteleírás és tanulmány a jól dokumentált, klinikailag és tudományosan átlátható adatbázisok fontosságát hangsúlyozza. Súlyos sérültek (ISS ≥ 16) esetében, a kezelés 6. és 72. órájában mért laborparaméterek kombinációjának vizsgálata, ezen belül is a WBC, PLT és kreatinin értékek egymással való összefüggései prediktív értékkel bírhatnak a kezelés kimenetelére nézve. Új prognosztikus faktorok feltárásában egy eseteleírás erősen korlátozott értékkel bír, így eredményeink validálásához, és a hazai traumatológiai kutatás további fejlődéséhez egy magyar trauma regiszter elindítása lenne szükséges.

IRODALOM

1. Bogner V., Keil L., Kanz K. G., Kirchoff C., Leidel B. A., Mutschler W., Biberthaler P.: Very early posttraumatic serum alterations are significantly associated to initial massive RBC substitution, injury severity, multiple organ failure and adverse clinical outcome in multiple injured patients. *Eur. J. Med. Res.* 2009. 14. (7): 284-291. <https://doi.org/10.1186/2047-783X-14-7-284>
2. Bone R. C.: Immunologic dissonance: a continuing evolution in our understanding of the systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and the multiple organ dysfunction syndrome (MODS). *Ann. Intern. Med.* 1996. 125. (8): 680-687. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-125-8-199610150-00009>
3. Chen G. Y., Nuñez G.: Sterile inflammation: sensing and reacting to damage. *Nat. Rev. Immunol.* 2010. 10. (12): 826-837. <https://doi.org/10.1038/nri2873>
4. Dewar D., Moore F. A., Moore E. E., Balogh Zs.: Postinjury multiple organ failure. *Injury.* 2009. 40. (9): 912-918. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2009.05.024>
5. Edwards A., Di Bartolomeo S., Chieragato A., Coats T., Della Corte F., Giannoudis P., Gomes E., Groenborg H., Lefering R., Leppaniemi A., Lossius H. M., Ortenwal P., Roise O., Rusnak M., Sturms L., Smith M., Thomsen A. B., Willett K., Woodford M., Yates D., Lecky F.: A comparison of European Trauma Registries. The first report from the EuroTARN Group. *Resuscitation.* 2007. 75 (2): 286-297. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2006.06.066>
6. Evans J. A., van Wessem K. J. P., McDougall D., Lee K.A., Lyons T., Balogh Zs. J.: Epidemiology of traumatic deaths: comprehensive population-based assessment. *World J. Surg.* 2010. 34 (1): 158-163. <https://doi.org/10.1007/s00268-009-0266-1>
7. Evans J. A., van Wessem K. J. P., McDougall D., Lee K. A., Lyons T., Balogh Zs. J.: Epidemiology of traumatic deaths: comprehensive population-based assessment. *World J. Surg.* 2010. 34 (1): 158-163. <https://doi.org/10.1007/s00268-009-0266-1>
8. Fröhlich M., Driessen A., Böhmer A., Nienaber U., Igrassa A., Probst C., Bouillon B., Maegele M., Mutschler M.: Is the shock index based classification of hypovolemic shock applicable in multiple injured patients with severe traumatic brain injury? An analysis of the TraumaRegister DGU®. *Scand. J. Trauma Resusc. Emerg. Med.* 2016. 24. (1): 148. <https://doi.org/10.1186/s13049-016-0340-2>
9. Hemmila M. R., Cain-Nielsen A. H., Wahl W. L., Vander Kolk W. E., Jakubus J. L., Mikhail J. N., Birkmeyer N. J.: Regional collaborative quality improvement for trauma reduces complications and costs. *J. Trauma Acute Care Surg.* 2015. 78. (1): 78-85. <https://doi.org/10.1097/TA.0000000000000494>

10. Hietbrink F., Koenderman L., Rijkers G., Leenenet L.: Trauma: the role of the innate immune system. *World J. Emerg. Surg.* 2006. 1: 15. <https://doi.org/10.1186/1749-7922-1-15>
11. Keel M., Trentz O.: Pathophysiology of polytrauma. *Injury.* 2005. 36 (6): 691-709. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2004.12.037>
12. Kernacki K. A., Goebel D. J., Poosch M. S., Hazlett L. D.: Early cytokine and chemokine gene expression during *Pseudomonas aeruginosa* corneal infection in mice. *Infect. Immun.* 1998. 66. (1): 376-379. <https://doi.org/10.1128/IAI.66.1.376-379.1998>
13. Mutschler M., Fau-Nienaber U., Brockamp T., Wafaisade A., Fabian T., Paffrath T., Bouillon B., Maegele M., TraumaRegister DGU: Renaissance of base deficit for the initial assessment of trauma patients: a base deficit-based classification for hypovolemic shock developed on data from 16,305 patients derived from the TraumaRegister DGU®. *Crit. Care.* 2013. 17. (2): R42. <https://doi.org/10.1186/cc12555>
14. Mutschler M., Paffrath T., Wölfl C., Probst C., Nienaber U., Schipper I. B., Bouillon B., Maegele M.: The ATLS® classification of hypovolaemic shock: a well established teaching tool on the edge? *Injury.* 2014. 45. (Suppl. 3): S35-38. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2014.08.015>
15. Oka Y., Murata A., Nishijima J., Yasuda T., Hiraoka N., Ohmachi Y., Kitagawa K., Yasuda T., Toda H., Tanaka N. et al.: Circulating interleukin 6 as a useful marker for predicting postoperative complications. *Cytokine.* 1992. 4. (4): 298-304. [https://doi.org/10.1016/1043-4666\(92\)90070-8](https://doi.org/10.1016/1043-4666(92)90070-8)
16. Roberts I., Shakur H., Coats T., Hunt B., Balogun E., Barnetson L., Cook L., Kawahara T., Perel P., Prieto-Merino D., Ramos M., Cairns J., Guerriero C.: The CRASH-2 trial: a randomised controlled trial and economic evaluation of the effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events and transfusion requirement in bleeding trauma patients. *Health Technol. Assess.* 2013. 17. (10): 1-79. <https://doi.org/10.3310/hta17100>

Dr. Csonka Endre

Szegedi Tudományegyetem, Traumatológiai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.